

Iverdrop

Spot-on-Lösung für Käfig- und Volieren Vögel.

Zusammensetzung: Ivermectin 0,12%.

Tierarzneimittel, das von der Registrierung ausgenommen ist.

Indikation

Bekämpfung von Milben, *Sternostoma tracheacolum* (Tracheen- und Luftsackmilbe), Sittichkrätze (*Gesichtsschuppen*) und Kreidefüße.

Bekämpfung von Blutläusen (*Dermanyssus gallinea*), Schaft- und Federläusen (*Mallophaga*).

Kontraindikationen

Nicht bei kranken oder schwachen Tieren anwenden.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe.

Nebeneffekte

In seltenen Fällen kommt es zu lokalen Hautreizungen.

In sehr seltenen Fällen Depression des Zentralnervensystems mit allen möglichen unerwünschten Wirkungen: Apathie, Appetitlosigkeit, Mydriasis, Ataxie, Muskelzittern, Muskelschwäche, Diarrhöe.

Wenn Sie schwerwiegende unerwünschte Wirkungen oder andere, in dieser Packungsbeilage nicht erwähnte Wirkungen feststellen, informieren Sie bitte Ihren Tierarzt.

Dosierung**Art der Anwendung**

Kanarienvögel, tropische Vögel: 1 Tropfen in den Nacken.

(Gras-)Sittiche und größere Vögel: 2 Tropfen in den Nacken.

Die Packung enthält eine Tropfpipette zur einfachen Dosierung.

Wenn Atemwegsmilben oder Krätze festgestellt werden, sollten alle Vögel in der Voliere behandelt werden.

Tragen Sie den/die Tropfen auf die Haut im Nacken des Tieres auf, so dass die Flüssigkeit nicht aufgeschleckt werden kann.

Dabei sollten die Federn so weit wie möglich zur Seite geschoben werden.

Die Behandlung kann nach 4 Wochen wiederholt werden, um eine Neuinfektion zu verhindern. Vorzugsweise sollten die Vögel 1-2 Monate vor der Brutzeit behandelt werden, um eine Nestinfektion zu verhindern.

Reinigen und desinfizieren Sie bei einem Befall mit der Tracheenmilbe auch das Vogelhaus, die Futter- und Tränken sowie die Tröge, in denen die Vögel baden.

Sicherheitsvorkehrungen für den Benutzer

Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Nach Gebrauch die Hände waschen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei Berührung mit den Augen mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Empfehlungen für Lagerung und Entsorgung

Im Originalbehälter bei Raumtemperatur aufbewahren. Nicht kühlen oder einfrieren.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Nicht verwendetes Tierarzneimittel oder seine Rückstände sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Verteiler:

Fendigo NV/SA

Herrmann Debrouxlaan 17

1160 Brüssel

Belgien

Fabrikant:

Beaphar B.V. Raalte

Niederlande